

Datos básicos

Las pruebas de detección de cáncer colorrectal salvan vidas

- Entre los tipos de cáncer que afectan tanto a hombres como a mujeres, el cáncer colorrectal es la segunda causa de muerte por cáncer en los Estados Unidos.
- Cada año, aproximadamente 53.000 personas (26.800 hombres y 26.200 mujeres) en los Estados Unidos murieron de cáncer colorrectal.
- El cáncer colorrectal es uno de los tipos de cáncer más comúnmente diagnosticados en los Estados Unidos. Cada año, 141.000 personas en los Estados Unidos (72.000 hombres y 69.000 mujeres) son diagnosticadas con cáncer colorrectal.
- Las pruebas de detección se recomiendan para hombres y mujeres a partir de los 50 años.
- A menudo, el cáncer colorrectal es prevenible. Las pruebas de detección ayudan a encontrar pólipos precancerosos para que puedan ser removidos antes de que se conviertan en cáncer.
- Las pruebas de detección ayudan a encontrar cáncer colorrectal en sus primeras etapas, cuando el tratamiento puede ser más eficaz.
- Su riesgo de tener cáncer colorrectal puede ser mayor de lo normal si usted o un pariente cercano ha tenido pólipos colorrectales o cáncer colorrectal, si tiene enfermedad inflamatoria intestinal o si tiene algún síndrome genético. Si piensa que su riesgo es mayor de lo normal, pregúntele a su médico a qué edad y con qué frecuencia debería hacerse las pruebas de detección.

Para obtener más información, llame al **1-800-CDC-INFO**
(1-800-232-4636—oprima 2 para español) o visite
www.cdc.gov/spanish/cancer/colorectal/sfl

